

治療スケジュール

*レジメン名	CBDCA+PTX+ニボルマブ+イピリムマブ療法(42日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	ニボルマブ(オプジーボ)360mg/body d1・22、イピリムマブ(ヤーボイ)1mg/kg d1、パクリタキセル 200mg/m ² d1・22、カルボプラチン AUC=6 d1・22

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(22)	d(42)	d()	d()	d()	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○	○					
		1日1回										
		ルート確保										
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○	○					
	☆	オプジーボ注	360	mg/body		○	○					
		1日1回										
		30kg未満の場合は、生食100mLから36mL抜いて										
		オプジーボ36mLを注入し、総量100mLにする										
		0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○						
		1日1回										
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	30	mL	30分	○						
	☆	ヤーボイ注	1	mg/kg		○						
		1日1回										
		生食50mLから20mL抜き、30mLとして使用										
		0.2-1.2μmのインラインフィルターを使用										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○	○					
		ポラミン注	5	mg		○	○					
		ファモチジン注	20	mg		○	○					
		グラニセロン注	1	mg		○	○					
		デキサート注	4.95	mg		○	○					
		アロカリス点滴静注235mg	1	V		○	○					
		1日1回										
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	250	mL	3時間	○	○					
	☆	パクリタキセル注	200	mg/m ²		○	○					
		1日1回										
		0.22μmフィルター使用										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○	○					
		1日1回										
		流しとして使用。時間短縮可能										
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	250	mL	1時間	○	○					
	☆	カルボプラチン注	6	AUC		○	○					
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○	○					
		1日1回										
		流しとして使用。時間短縮可能										
		休薬完了						●				