治療スケジュール

A-95

*レジメン名	PEM+Ami療法(皮下)(維持)(80kg未満)(21日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ500mg/㎡ d1、ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ2400mg/body d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○									
		デキサート注	6.6	mg		○									
		1日1回													
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	10分	○									
	☆	ペメトレキセド注	500	mg/㎡		○									
		1日1回													
		無菌製剤処理料1													
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○									
		1日1回													
通常点滴注射　メインルート		アセリオ点滴静注1000mg	100	mL	15分	○									
		1日1回													
		体重50kg未満の場合は15mg/kg													
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	15分	○									
		ファモチジン注射液20mg	1	A		○									
		ポララミン注5mg	1	A		○									
		1日1回													
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○									
		1日1回													
		流し													
皮下注射	☆	リブロファズ皮下注	2400	mg/body	5分	○									
		1日1回													
		無菌製剤処理料1													
		約5分かけて投与（翼状針を使用）													
		臍から約5cmの腹部皮下（1,4,7,10時方向）に翼状針を用いて投与													
		投与部位は前回と同一部位を避けるため、時計回りに部位を変える													
		休薬完了					●								
		以下別オーダー													
筋肉内注射		シアノコバラミン注1000μg	1	A	9週間ごと										
		1日1回			ペメトレキセド初回投与の少なくとも7日前に筋肉内注射。その後、ペメトレキセド投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと（3コースごと）に投与。										
内服		調剤用パンビタン末	1	g	連日										
		1日1回　（葉酸として0.5mg）			ペメトレキセド初回投与の7日以上前から連日経口投与。ペメトレキセドを中止又は終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り投与。										