治療スケジュール

A-98

*レジメン名	Ami+Laze療法(皮下)(80kg未満)(1ｺｰｽ目)(28日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ1600mg/body d1,8,15,22、ﾗｾﾞﾙﾁﾆﾌﾞ 240mg d1-28

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(22)	d(28)	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )
皮下注射	☆	リブロファズ配合皮下注	1600	mg/boby	5分	○									
		1日1回													
		無菌製剤処理料1													
		約5分かけて投与(翼状針を使用)													
		ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ投与60分前にﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ、ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ、ｶﾛﾅｰﾙ服用													
		臍から約5cmの腹部皮下(1,4,7,10時方向)に翼状針を用いて投与													
		投与部位は前回と同一部位を避けるため、時計回りに部位を変える													
皮下注射	☆	リブロファズ配合皮下注	1600	mg/boby	5分		○	○	○						
		1日1回													
		無菌製剤処理料1													
		約5分かけて投与(翼状針を使用)													
		ﾘﾌﾞﾛﾌｧｽﾞ投与30分前にﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ、ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ、ｶﾛﾅｰﾙ服用													
		臍から約5cmの腹部皮下(1,4,7,10時方向)に翼状針を用いて投与													
		投与部位は前回と同一部位を避けるため、時計回りに部位を変える													
		休薬完了								●					
		以下別オーダー													
内服	☆	ラズクルーズ錠	240	mg/日	day1～28										
		1日1回													
内服		デカドロン錠	10	mg	day1										
		ポララミン錠	2	mg	day1										
		カロナール錠	800	mg	day1										
		1日1回													
		リブロファズ投与60分前													
		デカドロン錠	8	mg	day8,15,22										
		ポララミン錠	2	mg	day8,15,22										
		カロナール錠	800	mg	day8,15,22										
		1日1回													
		リブロファズ投与30分前													
内服		エリキュース錠	5	mg/日	day1～28										
		1日2回			※DVT予防のためAmi+Laze療法開始後4ヵ月間投与										