治療スケジュール

B-1

*レジメン名	EC療法(21日間)(乳)
*投与量・投与日	エピルビシン90mg/㎡, エンドキサン600mg/㎡, d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○		
		デキサート注	9.9	mg		○		
		パロノセトロン注	0.75	mg		○		
		アロカリス点滴静注235mg	1	V				
		1日1回						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○		
		1日1回						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○		
	☆	エピルビシン注	90	mg/㎡		○		
		1日1回						
		無菌製剤処理料1						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○		
		1日1回						
		流し						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○		
	☆	エンドキサン注	600	mg/㎡		○		
		1日1回						
		無菌製剤処理料1(揮発性)						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○		
		1日1回						
		休薬完了					●	
		以下別オーダー						
内服		デカドロン錠	8	mg	d2,3,4			
		1日2回 朝昼食後						
内服		オランザピン錠	5	mg	d1～4			
		1日1回 夕食後			(day6まで延長可)			