

治療スケジュール

E-1

*レジメン名	CPT-11+CDDP(変法)療法(14日間)(胃)
*投与量・投与日	イリノテカン60mg/m ² d1、 CDDP30mg/m ² d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(14)	d()	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	500	mL	2時間	○			
		デキサート注射液	4.95	mg		○			
		グラニセトン注	1	mg		○			
		1日1回							
		点滴開始時にアプレピタントカプセル服用							
通常点滴注射	メインルート	5%ブドウ糖注	500	mL	90分	○			
	☆	イリノテカン注	60	mg/m ²		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液	500	mL	90分	○			
	☆	シスプラチン注	30	mg/m ²		○			
		1日1回							
		側管							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射	メインルート	ソルデム3A	500	mL	1時間	○			
		フロセミド注20mg	0.5	A		○			
		1日1回							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	250	mL	1時間	○			
		1日1回							
		休薬完了						●	
		以下別オーダー							
内服		アプレピタントカプセル	125	mg	d1				
		1日1回 1本目の点滴開始時							
内服		アプレピタントカプセル	80	mg	d2,3				
		1日1回 朝食後							