## 治療スケジュール

E-10

*レジメン名	LV5FU(RPMI)療法(56日間)(胃)	
*投与量•投与日	5FU 600mg/㎡ ・レボホリナート250mg/㎡	d1, 8, 15, 22, 29, 36

. + ++	. <b>.</b>		. 业. 曰	. ** /*	上海吐服 上海生產	1/41	1/0)	1/45	1/00)	1/00)	1/00)	1/50\	1/ \
*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度		d(8)	d(15)				d(56)	<b>d</b> ( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液		mL	15分	0	0	0	0	0	0		
		デキサート注射液	3.3	mg		0	0	0	0	0	0		
		1日1回											
		メイン											
側管点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	0	0	0	0	0	0		
		レボホリナート点滴注	250	mg/m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	0		
		1日1回											
		側管											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	5分	0	0	0	0	0	0		
	☆	フルオロウラシル注		mg/m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	0		
		1日1回		, and									
		I-LV開始1時間後、全開で投与	1										
		メイン	1										
		無菌製剤処理料1	1										
			<u> </u>										
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	25分	0	0	0	0	0	0		
		1日1回	1			l –	l –	Ĭ	Ĭ	Ĭ			
		メイン流し	1										
		, 12 //iLO	+										
		休薬完了	+			-							
			+			-							
			+										