

治療スケジュール

E-27

*レジメン名	トラスツズマブ+CapeOX療法【継続】(21日間)(胃)						
*投与量・投与日	トラスツズマブ 6mg/kg d1、オキサリプラチン 130mg/m ² d1、カペシタビン 2000mg/m ² d1夕～d15朝						

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 1日1回	50	mL	15分	○			
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 ☆ トラスツズマブBS注 注射用水20mL 1日1回 忍容性良好であれば30分まで短縮可 無菌製剤処理料1	250 6 0.015	mL mg/kg A/kg	90分	○ ○ ○			
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 デキサート注射液 パロノセトロン注 1日1回	50 6.6 1	mL mg V	15分	○ ○ ○			
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 ポララミン注5mg 1日1回	50 1	mL A	15分	○ ○			
通常点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖注 ☆ オキサリプラチン点滴静注液 1日1回 無菌製剤処理料1	250 130	mL mg/m ²	2時間	○ ○			
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 1日1回 流し 休薬完了	50	mL	15分	○ ●			
		以下別オーダー							
内服	☆	カペシタビン錠 1日2回 朝夕食後	2000	mg/m ²	d1夕～d15朝				
内服		デカドロン錠(0.5mg) 1日2回 朝昼食後	16	錠	d2,3				