治療スケジュール

-1

*レジメン名	5-FU+MMC+放射線療法(33日間)(肛門)
*投与量•投与日	マイトマイシン 10mg/m d1, d29 5-FU 1000mg/m d1-4, d29-32

*手技	瘟	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完]	*数量	*単位	占海時間 占海速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(29)	4(30)	d(31)	d(32)	4(33)
通常点滴注射 メインルー	<u> </u>	生食		ml	15分	0	U(2)	u(0)	U(+)	0	u (00)	u (01/	u (02)	u (00)
X2 (13 W(N-1/2/3) 7 1 2 7 7		デキサート注	-	mg	1073	Ŏ				ŏ				
		1日1回												
通常点滴注射 メインルート		生食	100		全開で	0				0				
	☆	マイトマイシン	10	mg∕ m i̇́		0				0				
		1日1回												
		無菌製剤処理料1												
S 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					-1.55									
通常点滴注射 メインルー		生食	1000		24時間	0	0	0	0	0	0	0	0	
	☆	フルオロウラシル	1000	mg/m²		0	0	0	0	0	0	0	0	
		1日1回												
		無菌製剤処理料1												
 通常点滴注射 メインルー		生食	50	mL	15分				0				0	
世市点尚圧別 アインルー	<u> </u>	工及 1日1回	30	IIIL	13/J				<u> </u>					
		小未儿												
		以下別処方												
内服		デカドロン錠(0.5mg)	8	錠	day2-4·30-32									
		1日2回 朝昼食後												