治療スケジュール F-17

*レジメン名 *投与量・投与日

Pmab+mFOLFOX6療法(14日間)(大腸)
レボホリナート200mg/m d1、オキサリプラチン85mg/m d1、5Fu400mg/m d1、5Fu2400mg/m d1、ベクティビックス6mg/kg d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了		*単位	点滴時間•点滴速度	d(1)	d(14)	d()	d()	d()
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		ロック用生食		mL		Ö				
		1日1回								
		開始時 CVポートフラッシュ								
	1	THE PART OF THE PA							1	
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	15分	0				
が応ばた場所がある。		デキサート注射液		mg	1 3/3	ŏ	-			
		グニーセトロン・1		A	<u> </u>	ŏ				
		グラニセトロン 1mg	<u> </u>	A		<u> </u>				
		1日1回			_	1				
		メイン①								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 		生理食塩液		mL	15分	0				
		ポララミン注	1	Α		0				
		1日1回								
		メイン②								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	100	mL	60分	0				
	☆	ベクティビックス		mg/kg		Ŏ				
		1日1回	Ĭ	1118/118		<u> </u>				
	1	メイン③		1	 	1		 	 	
		10.2万は0.22 4 カフィルカー 使用			+	1			1	
	1	0.2又は0.22 µ mフィルター使用 ベクティビックス開始から2時間要観察			1	1	 	1	1	
	1	ハンナイにツン人開始から2時间安観祭		1		1		<u> </u>	1	
		無菌製剤処理料1								
		at arm A. Ur ad-							ļ	
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 		生理食塩液	50	mL	15分	0				
		1日1回								
		メイン④								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	0				
		レボホリナート点滴注		mg/m ²		Ö				
		1日1回								
		側管⑤								
					 					
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	0				
<u>机芯注维易剂内内特物产人</u>	☆	オキサリプラチン点滴静注液				ŏ				
	×	オヤリソファンは、何即注放	60	mg/m ^²						
		1日1回								
		メイン⑤ 側管⑤と併流								
		無菌製剤処理料1								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液		mL	5分	0				
	☆	フルオロウラシル	400	mg/m ²		0				
		1日1回								
		メイン⑥								
		無菌製剤処理料1								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	100	mL	46時間 3.7mL/h	0				
	☆	フルオロウラシル		mg/m [†]	. O PY HJ O. / III L / II	ŏ				
	M	1日1回	2400	mg/III	 	\vdash			1	
		1日 1日 全量140mLに。(トレフューザー typeT)			+				1	
	1			1	 	-		1	1	
	1	メイン⑦			1	1	-	<u> </u>	1	
		無菌製剤処理料1						ļ	1	
		携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(化学療法用)								
	ļ					ļ			ļ	
		休薬完了					•			
		以下別オーダー			Ì	Ī				
		100 1 11111 1			<u> </u>					
内服	1	デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	d2,3	1			 	
אַתניין		1日2回 朝昼食後	10	业	uz,o				1	
	1	1日4日 初生及後		-	 	1	-	 	 	