

治療スケジュール

*レジメン名	BV+CPT-11療法(14日間)(大腸)
*投与量・投与日	ベバシズマブ5(～10)mg/kg d1, イリノテカン150mg/m ² d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(14)	d()	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○			
		デキサート注射液	4.95	mg		○			
		グラニセトロン静注液 1mg	1	A		○			
		1日1回							
		点滴開始時アプレピタントカプセル服用							
		メイン①							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	90分	○			
	☆	ベバシズマブBS点滴静注	5(～10)	mg/kg		○			
		1日1回							
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より60分に短縮可							
		それ以降、30分投与とすることができる							
		メイン②							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		メイン③ 流し							
通常点滴注射	メインルート	5%ブドウ糖注	250	mL	90分	○			
	☆	イリノテカン注	150	mg/m ²		○			
		1日1回							
		メイン④							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		メイン⑤ 流し							
		休薬完了					●		
		以下別オーダー							
内服		アプレピタントCap	125	mg	d1				
		1日1回 1本目の点滴開始時							
内服		アプレピタントCap	80	mg	d2,3				
		1日1回 朝食後							