治療スケジュール

F-30

*レジメン名	S-1+CPT-11＋BV（IRIS＋BV）療法(28日間)(大腸)
*投与量・投与日	CPT－11　100mg/㎡ d1、15　　S－1　80mg/㎡ d1夕～15朝

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d（1）	d（15）	d（28）	d（　）	d（　）
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○			
		デキサート注	4.95	mg		○	○			
		グラニセトロン注	1	mg		○	○			
		1日1回								
		点滴開始時にアプレピタントカプセル服用								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩水	100	ml		○	○			
	☆	ベバシズマブBS点滴静注	5	mg/kg	90分	○	○			
		1日1回								
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より60分に短縮可								
		それ以降、30分投与とすることできる。								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○			
		1日1回								
		流し								
通常点滴注射　メインルート		５%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○	○			
	☆	イリノテカン注	100	mg/㎡		○	○			
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○			
		1日1回								
		流し								
		休薬完了						●		
		以下別オーダー								
内服	☆	Ｓ－１	80	mg/㎡	d1夕～15朝					
		1日2回　朝夕食後								
内服		アプレピタントCap	125	mg	day1・15					
		１日１回　1本目の点滴開始時								
内服		アプレピタントCap	80	mg	day2・3・16・17					
		１日１回　朝食後								