

## 治療スケジュール

F-34

*レジメン名	BV+CAPIRI療法(21日間)(大腸)							
*投与量・投与日	ベバシズマブ 7.5mg/kg d1、イリノテカン 200mg/m <sup>2</sup> d1、カペシタビン 1600mg/m <sup>2</sup> d1夕～d15朝							
*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○		
		デキサート注	4.95	mg		○		
		グラニセトロン注	1	mg		○		
		1日1回						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	90分	○		
	☆	ベバシズマブBS点滴静注	7.5	mg/kg		○		
		1日1回						
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より60分に短縮可						
		それ以降、30分投与とすることができる。						
		無菌製剤処理料1						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○		
		1日1回						
		流し						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	2時間	○		
	☆	イリノテカン注	200	mg/m <sup>2</sup>		○		
		1日1回						
		イリノテカン開始1時間前にアプレビタントカプセル服用						
		無菌製剤処理料1						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○		
		1日1回						
		流し						
		休薬完了				●		
		以下別オーダー						
内服	☆	カペシタビン錠	1600	mg/m <sup>2</sup>	d1夕～d15朝			
		1日2回 朝夕食後						
内服		アプレビタントCap	125	mg	day1			
		1日1回 イリノテカン開始1時間前にアプレビタントカプセル服用						
内服		アプレビタントCap	80	mg	day2,3			
		1日1回 朝食後						