

## 治療スケジュール

F-37

*レジメン名	CapeOX療法(21日間)(小腸)						
*投与量・投与日	オキサリプラチン 130mg/m <sup>2</sup> d1、カペシタビン 1500mg/m <sup>2</sup> /day d1～d14						
*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	
		デキサート注射液	6.6	mg		○	
		パロノセトロン0.75mg注	1	V		○	
		1日1回					
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	
		ポララミン注5mg	1	A		○	
		1日1回					
通常点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○	
	☆	オキサリプラチン点滴静注液	130	mg/m <sup>2</sup>		○	
		1日1回					
		無菌製剤処理料1					
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	25分	○	
		1日1回					
		流し					
		休薬完了				●	
		以下別オーダー					
内服	☆	カペシタビン錠	1500	mg/m <sup>2</sup>	d1～14		
		1日2回 朝夕食後					
内服		デカドロン錠	8	mg	d2・3		
		1日2回 朝昼食後					