治療スケジュール

F-40

*レジメン名	Cmab+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ療法【初回】(28日間)(大腸)
*投与量・投与日	アービタックス 400 mg/㎡ d1 250 mg/㎡ d8、15、22　ビラフトビカプセル 300mg d1-28　メクトビ錠 90mg d1-28

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(22)	d(28)	d(　)	d(　)
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○			
		デキサート注	6.6	mg		○	○	○	○			
		ポララミン注	1	A		○	○	○	○			
		1日1回										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○			
		ファモチジン注	20	mg		○	○	○	○			
		1日1回										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○						
	☆	アービタックス注	400	mg/㎡		○						
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間		○	○	○			
	☆	アービタックス注	250	mg/㎡			○	○	○			
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	1時間	○	○	○	○			
		1日1回										
		経過観察　及び　流し										
		休薬完了								●		
		以下別オーダー										
内服	☆	ビラフトビカプセル	300	mg	d1-28							
		1日1回										
	☆	メクトビ錠	90	mg	d1-28							
		1日2回										