

# 治療スケジュール

G-1

*レジメン名	nab-PTX+ゲムシタビン療法(28日間)(臍)
*投与量・投与日	アブラキサン 125mg/m <sup>2</sup> +ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup> d1,8,15

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(28)	d( )	d( )
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	30分	○	○	○			
		デキサート注射液	6.6	mg		○	○	○			
		グラニセトロン注 1mg	1	A		○	○	○			
		1日1回									
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○	○	○			
	☆	アブラキサン注	125	mg/m <sup>2</sup>		○	○	○			
		1日1回									
		インラインフィルターは使用しないこと									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○			
		1日1回									
		流し									
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○	○	○			
	☆	ゲムシタビン注	1000	mg/m <sup>2</sup>		○	○	○			
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○			
		1日1回									
		流し									
		休薬完了							●		