治療スケジュール

G-8

*レジメン名	modified　FOLFIRINOX療法(14日間)(膵)
*投与量・投与日	オキサリプラチン85mg/㎡　d1、 レボホリナート200mg/㎡　d1、　イリノテカン150mg/㎡　d1、　5Fu2400mg/㎡　d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(14)	d( )	d( )
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		ロック用生食	10	mL		○			
		1日1回							
		開始時　CVポートフラッシュ							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		デキサート注射液	9.9	mg		○			
		パロノセトロン静注0.75mg	1	A		○			
		1日1回							
		点滴開始1時間前にアプレピタントカプセル服用							
		メイン①							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○			
	☆	オキサリプラチン注	85	mg/㎡		○			
		1日1回							
		メイン②							
		無菌製剤処理料1							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○			
		レボホリナート点滴注	200	mg/㎡		○			
		1日1回							
		メイン③							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注	250	mL	90分	○			
	☆	イリノテカン注	150	mg/㎡		○			
		1日1回							
		側管③							
		メイン③と併流							
		無菌製剤処理料1							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	100	mL	46時間　3.7mL/h	○			
	☆	フルオロウラシル注	2400	mg/㎡		○			
		1日1回							
		全量140mLに。(トレフューザー typeT)							
		メイン④							
		無菌製剤処理料1							
		携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(化学療法用)							
		休薬完了					●		
		以下別オーダー							
内服		アプレピタントCap	125	mg	d1				
		1日1回　1本目の点滴開始1時間前							
内服		アプレピタントCap	80	mg	d2・3				
		1日1回　朝食後							
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	d2～4				
		1日2回　朝昼食後							