

治療スケジュール

J-7

*レジメン名	CVP療法(21日間)(悪性リンパ)
*投与量・投与日	オンコビン1.4mg/m ² D1,エンドキサン750mg/m ² D1,プレドニン(5)20錠分2D1-5

*手技	癌	*薬品名*用法*コメント*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	ml	30分	○			
		グラニセトン静注液(1mg)	1	mg		○			
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	ml	全開	○			
	☆	オンコビン	1.4	mg/m ²		○			
		1日1回							
		オンコビン最大投与量 2mg/body							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	ml	15分	○			
		1日1回							
		流し							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	ml	2時間	○			
	☆	エンドキサン	750	mg/m ²		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1(揮発性)							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	ml	15分	○			
		1日1回							
		休薬完了						●	
		以下別オーダー							
内服	☆	プレドニン錠(5mg)	100	mg/body	day1-5				
		1日2回 朝昼食後							