

治療スケジュール

J-8

*レジメン名	R-CHOP(d1)療法(IR無)(21日間)(悪性リンパ)
*投与量・投与日	リツキシマブ 375mg/m <sup>2</sup> D1, ドキソルビシン 50mg/m <sup>2</sup> D1, オンコピン1.4mg/m <sup>2</sup> D1, エンドキサン750mg/m <sup>2</sup> D1, プレドニン(5)20錠分2d1-5

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d( )	d( )
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	15分	○			
		1日1回							
		流し							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	337.5	ml/m <sup>2</sup>	100→200→300mL/hで	○			
	☆	リツキシマブBS注	375	mg/m <sup>2</sup>	(30分毎100mL/h up)	○			
		1日1回							
		100→200→300mL/hで(30分毎100mL/h up)							
		リツキシマブ1mg/mLに濃度調整							
		リツキシマブ投与30分前にポララミン、カロナール服用							
		最大投与速度400mL/h							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	ml	30分	○			
		グラニセトロン静注液1mg	1	A		○			
		1日1回							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	ml	30分	○			
	☆	ドキソルビシン	50	mg/m <sup>2</sup>		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	全開	○			
	☆	オンコピン	1.4	mg/m <sup>2</sup>		○			
		1日1回							
		オンコピン最大投与量 2mg/body							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	15分	○			
		1日1回							
		流し							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	500	ml	2時間	○			
	☆	エンドキサン	750	mg/m <sup>2</sup>		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1(揮発性)							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	15分	○			
		1日1回							
		休薬完了					●		
		以下別オーダー							
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day1				
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1				
		1日1回 リツキシマブ投与30分前							
内服	☆	プレドニン錠(5mg)	100	mg/body	day1-5				
		1日2回 朝昼食後							