

治療スケジュール

J-101

*レジメン名	Pola-BR療法(IR無)(2~6コース目)(21日間)(悪性リンパ腫)
*投与量・投与日	リツキシマブ 375mg/m <sup>2</sup> day1、ポライビー 1.8mg/kg day2、トレアキシシ 90mg/m <sup>2</sup> day2,3

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 1日1回	50	mL	15分	○					
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 ☆ リツキシマブBS注 1日1回 100→200→300mL/hで(30分毎100mL/h up) リツキシマブ1mg/mLに濃度調整 リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン服用 最大投与速度400mL/h 無菌製剤処理料1	337.5 375	ml/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	100→200→300mL/h (30分毎100mL/h up)	○ ○					
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 パロノセトロン注 デキサート 1日1回	100 0.75 6.6	mL mg mg	30分	○ ○ ○					
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 デキサート 1日1回	100 6.6	mL mg	30分		○ ○				
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 注射用蒸留水 ☆ ポライビー注 1日1回 体重42kg未満では、輸液を50mLに変更する。 忍容性が良好であれば、投与時間は30分まで短縮可。 0.2μmまたは0.22μmインラインフィルターを使用する。 無菌製剤処理料1	100 20 1.8	mL ml mg/kg	90分	○ ○ ○					
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 1日1回	100	mL	30分	○ ○					
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 ☆ トレアキシシ注 1日1回 無菌製剤処理料1(揮発性)	250 90	mL mg/m <sup>2</sup>	60分	○ ○	○ ○				
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液 1日1回  休薬完了	50	mL	15分	○ ○					●
以下別オーダー											
内服		カロナール錠(500mg) ポララミン錠(2mg) 1日1回 リツキシマブの30分前に	1 1	錠 錠	day1 day1						
内服		デカドロン錠 1日2回 朝昼食後	8	mg	day3・4						