

治療スケジュール

*レジメン名	Isa-Kd療法(2コース目以降)(28日間)(MM)							
*投与量・投与日	イサキシマブ10mg/kg day1,15、カルフィルゾミブ56mg/m ² day1,2,8,9,15,16、レナテックス錠 20mg day2,8,9,16,22,23							
*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(8)
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○		
		ポララミン	5	mg		○		
		ファモチジン	20	mg		○		
		デキサート注	16.5	mg		○		
		1日1回						
		サークリサ投与30分前に投与						
		サークリサ投与30分前にコナール服用						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	250	mL	175→275→375mg/hで	○		
	☆	サークリサ点滴静注	10	mg/kg	(30分毎100mg/h up)	○		
		175→275→375mg/hで(30分毎100mg/h up)						
		総量250mLに調製						
		最大投与速度400mg/h						
		0.2μm又は0.22μmのインラインフィルターを使用すること。						
		無菌製剤処理料1						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○
		1日1回						
通常点滴注射	メインルート	5%ブドウ糖液	100	mL	30分	○	○	○
		注射用蒸留水 100ml	1	本	(カイクロリス溶解用)	○	○	○
	☆	カイクロリス点滴静注用	56	mg/m ²		○	○	○
		1日1回						
		無菌製剤処理料1						