G-CHOP療法(IR無)(2-6コース目)(21日間)(悪性リンパ)腫)

| おビヌツズマブ 1000mg/body d1、ドキソルビシン 50mg/m゚ d2、オンコビン 1.4mg/m゚ d2、エンドキサン 750mg/m゚ d2 *レジメン名 *投与量·投与日

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間·点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()	d()	d()	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液		mL	15分	Ö		1	,,	,,,	,,	,,	
22117/10/1-1/22/3		パロノセトロン静注0.75mg		V		Ŏ							
		1日1回											1
		点滴開始45分前にプレドニン・カロナール・ポララミン内服											1
		WASHIND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP			<u> </u>								<u> </u>
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	210	mL		0							ı
		ガザイバ点滴静注			25mL/hで開始	T Ö							l
		1日1回	1,000	ing, body	, 20112/ 11 (7)174	─ 							<u> </u>
		生食250mLから40mL抜き、210mLとして使用											i
		25mL/hで開始、30分後に最大225mL/hまでup可											
		0.2又は0.22 µ mフィルター使用											i
		無菌製剤処理料1											
		無因表別処理科		<u> </u>			1		-				
		上 四 条			157								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分								
		1日1回											
<u> </u>				<u> </u>	00/	+		ļ					
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液		mL . å	30分	0							
	☆	ドキソルビシン注	50	mg/m ²		0							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
													1
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	全開	0							l
	☆	オンコビン注	1.4	mg/m ²		0							1
		1日1回											1
		オンコビン最大投与量 2mg/body											
		無菌製剤処理料1											1
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	0							l
		エンドキサン注		mg/m ²	E 8 7 [H]	T ŏ							
	_^	1日1回	700	11118/111		 							<u> </u>
		無菌製剤処理料1(揮発性)											i
		無因表別処理科八理元任/											
		生理食塩液	50	mL	15分		1						
			30	ImL	11077	-							
		1日1回											
													1
		休薬完了											
													
		以下別オーダー											
													l
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day1								
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1								
		1日1回 ガザイバ投与60分前											_
内服	☆	プレドニン錠(5mg)	100	mg/body	day1-5								
	T `	1日2回 朝昼食後]									ı
		(day1)ガザイバ投与60分前					1	1	†				1
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		1	<u> </u>	_	1		 				
内服	-	バクタ配合錠	1	錠	day1-21		1	1	 				
		1日1回 朝食後	 '	业	uayı Zı			1	 				
		口 凹 初及攻		1	+		1	1	-				
<u>. </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	ļ]						