

治療スケジュール

J-58

*レジメン名	CHASE療法(21日間)(悪性リンパ腫)
*投与量・投与日	シクロホスファミド 1200mg/m <sup>2</sup> day1, エトポシド 100mg/m <sup>2</sup> day1-3, シタラビン 2000mg/m <sup>2</sup> day2,3

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(21)
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○	○	
		グラニセトロン	1	mg		○	○	○	
		デキサート	33	mg		○	○	○	
		1日1回							
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○			
	☆	エンドキサン	1200	mg/m <sup>2</sup>		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1(揮発性)							
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○	○	○	
	☆	エトポシド	100	mg/m <sup>2</sup>		○	○	○	
		1日1回							
		エトポシド濃度0.4mg/mLを超えると結晶析出の恐れがあるため0.4mg/mL以下になるよう生食追加							
		無菌製剤処理料1							
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○	○	
		1日1回							
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	3時間		○	○	
	☆	キロサイドN	2000	mg/m <sup>2</sup>			○	○	
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	
		1日1回							
		休薬完了							●
		以下別オーダー							
皮下注射		フィルグラスチムBS注	75	μg/body	day5以降				
		1日1回							
		(ジーラスタへの変更可)							
点眼		ベタメタゾンリン酸エステルNaPF眼耳鼻科用液0.5%			day2 6時からday4 6時まで6時間ごとに投与				
		1日4回 両目							