*レジメン名 *投与量・投与日 ドキソルビシン+イホスファミド療法(21日間)(軟部腫瘍) ドキソルビシン 20mg/m d1~d3、イホマイド 2000mg/m d1~d5

*投与量・投与日	トキソ	ルビシン 20mg/㎡ d1~d3、イホマイド 2000mg/㎡ d1~c	d5										
*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間·点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(5)	d(6)	d(21)	d()
通常点滴注射 メインルート	/111	ソルデム1輸液		mL	60分	O	O O	O	O	O	u (0)	U(21)	u()
近田 無利江河 デーブルー		1日1回			,,		Ŭ						
		点滴開始時アプレピタント服用(day1~5)											
译带上连连轴 7.70 11 1		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	500		00/\							<u> </u>	
通常点滴注射 メインルート		ソルデム1輸液 1日1回	500	mL	60分						0	$\vdash \vdash$	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				+					1	-	
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分	0	0	0	0	0			
		デキサート注射液	9.9	mg		0	0	0	0	0			
		グラニセトロン静注液1mg	1	Α		0	0	0	0	0			
		1日1回					<u> </u>			<u> </u>			
通常点滴注射 メインルート	-	 生理食塩水	100	mL	30分	0	0	0		1		 	
	☆	ドキソルビシン注		mg/m ²	307	0	Ö	0					
	<u> </u>	1日1回	20	mg/ m		Ŭ	ľ	Ŭ					
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート	1	生理食塩水	50	mL	15分	0	0	0				<u> </u>	
		1日1回						-					
通常点滴注射 メインルート		 生理食塩水	500	mL	2時間	0	0	0	0	0		-	
連市 無利(注対) アドレブル	*	注射用イホマイド		mg/m ²	E1 [H]	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ			<u> </u>
	ĽŤ	1日1回	2000		<u> </u>	L	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	L		L
		無菌製剤処理料1(揮発性)											
(B) Mr SS 64 / / · · ·		14-ma/5-1-		ļ	457	_		_				igsquare	
側管注射 メインルート	_	生理食塩水		mL	15分	0	0	Ŏ	0	Ŏ	<u> </u>		<u> </u>
	-	ウロミテキサン注 1日1回(イホマイド点滴終了直後)	400	mg/m ²		0	0	0	0	0		\vdash	-
		1日1日(11小八丁厂品/向校 1 旦夜/		1		+							
通常点滴注射 メインルート		ソリューゲンF注	500	mL	90分	0	0	0	0	0			
		メイロン静注7% 20mL		Α		0	Ō	0	0	Ō			
		L-アスパラギン酸K点滴静注液 10mEq		Α		0	0	0	00	0			
	1	フロセミド注 20mg/mL	1	Α		0	0	0	0	0		<u> </u>	
	1	1日1回		1							-		
通常点滴注射 メインルート		 ソルデム1輸液	500	mL	90分	0	0	0	0	0		-	
		メイロン静注7% 20mL		A	307]	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ			
		1日1回		,			Ŭ		Ŭ	Ŭ			
通常点滴注射 メインルート	1	ソリューゲンF注	500		90分	Q	0	Q	0	Q		<u> </u>	
		メイロン静注7% 20mL		A		0	0	0	0	0		┝	
	-	L-7スパラギン酸K点滴静注液 10mEq フロセミド注 20mg/mL		A A		0	0	0	0	0		\vdash	
		1日1回	<u> </u>	^									
		1416											
側管注射 メインルート 通常点滴注射 メインルート		生理食塩水		mL	15分	0	0	0	0	0			
		ウロミテキサン注 1日1回(イホマイド点滴終了4時間後)	400	mg/m³		0	0	0	0	0			
	1	1日1回(イホマイド点滴終了4時間後)										<u> </u>	
		 ソルデム1輸液	500	1	90分	0			0	0			
		ブルナム 制液 メイロン静注 7% 20mL		ML A	9077	0	8	0	0	Ö			
		1日1回	'	^									
通常点滴注射 メインルート		ソルデム1輸液		mL	90分	0	0	0	0	0			
		メイロン静注7% 20mL	1	Α		0	0	0	0	0		$ldsymbol{eta}$	
		1日1回											
側管注射 メインルート		 生理食塩水	50	mL	15分	0	0	0	0	0		\vdash	
対 10 大工 27 1 27 1		ウロミテキサン注		mg/m ²	1073	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ			
		1日1回(イホマイド点滴終了8時間後)											
		休薬完了		ļ				<u> </u>				•	
	1			1	1	1	-	 		-	 	\vdash	
	<u> </u>	<u> </u> 以下別オーダー		1	<u> </u>	1	<u> </u>			<u> </u>		_	_
		 	- 	 	+	1							
内服		アプレピタントカプセル	125	mg	day1							\Box	
内服		アプレピタントカプセル ソルデム1点滴開始時経口		Ľ	<u> </u>								
		アプレピタントカプセル	80	mg	day2.3.4.5	1		<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>
	1	ソルデム1点滴開始時経口		1	1	1	-	 		-	 	\vdash	
	1		+	}		+		 		-	1	\vdash	
	 	以下別オーダー	-	<u> </u>	<u> </u>	1	1			1	<u> </u>	=	_
		- 1 M24 /		†		1		l			l		
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	day6-8								
		1日2回 朝昼食後											