

治療スケジュール

*レジメン名	リツキシマブ療法(28日間)(血管炎)
*投与量・投与日	リツキシマブ 375mg/m <sup>2</sup> d1,8,15,22

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(22)	d(28)	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 1日1回	50	mL	15分	○	○	○	○			
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 リツキシマブ 1日1回 50→100→150mL/hで(30分毎50mL/h up) リツキシマブ1mg/mLに濃度調整 リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン服用 最大投与速度400mL/h 無菌製剤処理料1	375	mL/m <sup>2</sup> 375	50→100→150mL/hで (30分毎50mL/h up)	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○			
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 1日1回 流し  休薬完了	50	mL	15分	○	○	○	○			●
		以下別オーダー										
内服		カロナール錠(500mg) ポララミン錠(2mg) 1日1回 リツキシマブの30分前に	1	錠	day1、8、15、22							
			1	錠	day1、8、15、22							
通常点滴注射(パルス療法)		注射用ソルメルコート500mg 1日1回 点滴静注	1000	mg/day	1-3日間							
内服		プレドニン錠(5mg) 1日2回 朝昼食後	1	mg/kg	パルス療法後							